

2. Házi feladat (határidő: 2017-02-24)

A feladatokra teljes megoldást kérünk részletszámításokkal, indoklással, az eredmény leírása nem elegendő. Más megoldását lemásolni nem szabad!

- Tudjuk, hogy az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ mátrixra az $\langle x, y \rangle := \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$ bilineáris függvény skalárszorzatot ad \mathbb{R}^2 -en.
 - Mi az \mathbf{e}_1 és \mathbf{e}_2 vektorok hossza és skalárszorzata erre a skalárszorzatra nézve?
 - Adjunk meg egy ortonormált bázist!

- Legyen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

Határozzuk meg \mathbf{A} QR-felbontását Gram-Schmidt-féle ortogonalizációval!

- Írjuk fel azt a 2×2 -es forgatás mátrixot, amely az $(1, 2)$ vektort elforgatja a $(\sqrt{5}, 0)$ vektorba!
 - Írjuk fel a $\mathbf{v} = (1, -1, 1, -1)$ normálvektorú hipersíkra való Householder-tükrözés mátrixát!
 - Írjuk fel azt a Householder-tükrözést, amely a $\mathbf{v} = (1, -1, 1, -1)$ vektort olyan vektorba viszi, amelynek csak az első koordinátája nem nulla, és az első koordináta negatív! Milyen normálvektorú hipersíkra tükröz ez a transzformáció?

- Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & -5 & 7 \\ 3 & 10 & 1 \\ 0 & -12 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix QR-felbontását Givens-forgatások segítségével!

- Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

mátrix QR-felbontását Householder-tükrözések segítségével!

- Határozzuk meg az $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszer összes optimális megoldását QR-felbontás segítségével, ha \mathbf{A} a 2. feladat mátrixa, és $\mathbf{b} = (0, 0, 0, 1)$! Hány optimális megoldása van?
- Bizonyítsuk be, hogy minden $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorra teljesül:
$$||\mathbf{u}| - |\mathbf{v}|| \leq |\mathbf{u} - \mathbf{v}|.$$
Mikor van egyenlőség?
- Bizonyítsuk be, hogy minden $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorra teljesül:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2} (|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{v}|^2).$$

- Mutassuk meg, hogy minden szemiortogonális mátrix kiegészíthető ortogonális mátrixszá!
 - Az 2. feladatbeli QR-felbontás \mathbf{Q} mátrixát egészítsük ki ortogonális mátrixszá és ennek segítségével adjuk meg \mathbf{A} teljes QR-felbontását!
- Melyik szemiortogonális az alábbi mátrixok közül? Mindegyik mátrixra állapítsuk meg, hogy melyik oldali inverze létezik és azt számítsuk ki!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

*11 Legyen $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ tetszőleges bázis \mathbb{R}^n -ben. Bizonyítsuk be, hogy pontosan egy olyan $\{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n\}$ bázis létezik, amelyre $\mathbf{b}_i \mathbf{c}_j = \delta_{ij} \forall i, j$ -re!

*12 Adjunk meg végtelen sok olyan vektort \mathbb{R}^n -ben, amelyek közül bármely n darab független, de semelyik kettő nem merőleges egymásra!